


GUIDA PRATICA ALLE VACCINAZIONI NELL'ADULTO
IN MEDICINA GENERALE

VACCINAZIONE ANTIPNEUMOCOCCICA

- REGIONE LAZIO -



**PROGRAMMA REGIONALE DI VACCINAZIONE CON
VACCINO ANTIPNEUMOCOCCICO 2023-24**



RACCOMANDAZIONI D'USO

PREMESSA

Le infezioni da *Pneumococco*, prima causa di polmonite batterica e di patologie invasive gravi quali meningite, sepsi e batteriemia, sono tra le principali cause di mortalità e morbilità nel mondo. Il nuovo PNPV 2023-25 individua nella vaccinazione antipneumococcica, livello essenziale di assistenza, una priorità di sanità pubblica, anche nell'importante ruolo di contrasto all'antimicrobicoresistenza.

La Regione Lazio individua nel 75% l'obiettivo minimo di copertura da raggiungere, sia sui soggetti ultrasessantacinquenni, che su quelli di età inferiore a rischio per patologia.

POPOLAZIONE TARGET

- ❖ **PERSONE DI ETÀ ≥ 65 ANNI**
- ❖ **PERSONE DI ETÀ' < 65 ANNI A RISCHIO DI CONTRARRE LA MALATTIA PER LA PRESENZA DELLE SEGUENTI PATOLOGIE O CONDIZIONI PREDISPONENTI:**
 - ✓ *Cardiopatie croniche*
 - ✓ *Malattie polmonari croniche*
 - ✓ *Diabete Mellito*
 - ✓ *Epatopatie croniche, inclusa la cirrosi epatica e le epatopatie croniche evolutive da alcool*
 - ✓ *Alcoolismo cronico*
 - ✓ *Soggetti con perdite liquorali da traumi o intervento*
 - ✓ *Presenza di impianto cocleare*
 - ✓ *Emoglobinopatie quali anemia falciforme e talassemia*
 - ✓ *Immunodeficienze congenite o acquisite*
 - ✓ *Infezione da HIV*
 - ✓ *Condizioni di asplenia anatomica o funzionale e pazienti candidati alla splenectomia*
 - ✓ *Patologie onco-ematologiche (leucemie, linfomi e mieloma multiplo)*
 - ✓ *Neoplasie diffuse*
 - ✓ *Trapianto d'organo o di midollo*
 - ✓ *Patologie richiedenti un trattamento immunosoppressivo a lungo termine*
 - ✓ *Sindrome nefrosica o insufficienza renale cronica*
- ❖ **OPERATORI SANITARI**

ATTUALI RACCOMANDAZIONI D'USO

- **PERSONE ADULTE CHE INIZIANO IL CICLO VACCINALE**
Raccomandato **VACCINO CONIUGATO 20-VALENTE APEXXNAR** (indicato attualmente dai 18 anni)
- **PERSONE CHE HANNO RICEVUTO PREVENAR 13**
Schedula sequenziale con somministrazione a distanza di almeno un anno del **VACCINO POLISACCARIDICO NON CONIUGATO 23- VALENTE PNEUMOVAX**
- **PERSONE CHE HANNO COMPLETATO LA SCHEDULA SEQUENZIALE**
Al momento non previsti ulteriori vaccini
- **PERSONE DI ETÀ' tra 2 e 17 ANNI**
Raccomandato **VACCINO CONIUGATO 15-VALENTE VAXNEUVANCE** (in attesa dell'autorizzazione per le età pediatriche del **VACCINO APEXXNAR**) seguito a distanza di almeno un anno da **PNEUMOVAX**
- **PERSONE ADULTE CON UNA MARCATO COMPROMISSIONE DELLA RISPOSTA IMMUNITARIA (ES. CON INFEZIONE DA HIV)**
APEXXNAR oppure **VAXNEUVANCE** seguito dopo un anno da **PNEUMOVAX**

Novità in caso di precedente vaccinazione

RACCOMANDAZIONI **A**DVISORY **C**OMMITTEE ON **I**MMUNIZATION **P**RACTICES, CDC,
USA, Settembre 2023

- **PERSONE CHE HANNO RICEVUTO PREVENAR 13:**


- *Raccomandato **PCV20 APEXXNAR** a distanza di almeno un anno in alternativa a **PPSV23 PNEUMOVAX***

- **PERSONE CON PATOLOGIA CHE HANNO RICEVUTO PCV13 SEGUITO DA PPSV23:**

- *Possibile raccomandare **PCV20 APEXXNAR** in alternativa a **PPSV23 PNEUMOVAX** a distanza di almeno 5 anni*

Bibliografia:

- <https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/72/rr/rr7203a1.htm#recommendationsforuseofpneumococcalvaccin esinadultsaged%E2%89%A565years>



A cura di:
Ombretta Papa – Responsabile Nazionale Area Vaccini SIICP



SOCIETÀ ITALIANA INTERDISCIPLINARE PER LE CURE PRIMARIE

<https://www.siicp.it>